

ADVIESBRIEVEN VAN UW DIERENARTS

ADVIESBRIEF 46

MEDISCHE RISICO'S BIJ DE PASGEBOREN PUP OF KITTEN

Mijn hond of kat is net bevallen. Waarop moet ik letten bij de pups en kittens?

Nadat je teef of poes bevallen is moet je de kleintjes gedurende een paar weken goed opvolgen.

In deze adviesbrief krijg je tips aangaande deze periode. Waar moet je op letten, wanneer loopt het fout en hoe moet je ingrijpen? We bespreken hieronder enkele veel voorkomende risico's:

- suikertekort
- uitdroging
- onderkoeling
- ondervoeding
- braken en/of diarree.

1. De pups of kittens hebben een **suikertekort**

Suikertekort wordt meestal veroorzaakt door een te geringe opname van melk. Dit kan liggen:

- aan *de moeder* (bijvoorbeeld door een ontsteking van de melkklieren);
- aan *de pup of de kitten* zelf (door een aangeboren afwijking kan er bijvoorbeeld iets mis zijn met de stofwisseling);
- of aan *de omgeving* (voorbeelden hiervan zijn een te hoge of te lage omgevingstemperatuur, te veel hanteren van de pasgeborenen waardoor ze te moe zijn om te zogen enz.).

Een suikertekort herken je aan de volgende **symptomen**:

- de pups of kittens zijn heel onrustig en piepen constant

- ze voelen koud aan
- ze ademen te snel
- ze vertonen stuipjes
- ze kunnen in coma gaan

Wat moet je doen?

Dien zo snel mogelijk suiker toe. Toediening van een suikeroplossing onder de tong zorgt meestal snel voor resultaat. Betert het niet binnen de 15 minuten, dan moet je met het diertje naar de dierenarts. Die gaat dan een infuus moeten toedienen met een verdunde suikeroplossing.

Deze aandoening zien we vooral bij honden van de zogenaamde 'toy-rassen': minipoedels, malthezers, chihuahua's enz. Het is dan ook niet verstandig om deze dieren slechts 2 maaltijden per dag te geven tot ze de leeftijd van 6 maand bereiken. *Verschillende kleine porties per dag is voor hen veel beter!*

2. De pups of kittens zijn uitgedroogd

Pasgeboren en zeer jonge dieren raken veel sneller uitgedroogd dan volwassen dieren. Een paar dagen braken of diarree of een paar dagen minder goed eten kunnen al uitdroging tot gevolg te hebben.

Uitdroging herken je aan de volgende **symptomen**:

- de pups of kittens piepen in het begin constant, maar worden dan slomer en slomer;
- hierdoor gaan ze minder drinken en krijgen ook de klachten van een suikertekort (zie hierboven);
- uiteindelijk gaan de diertjes in shock. Dit herken je aan de koude pootjes en het bleke tandvlees. Als er niet snel wordt ingegrepen kunnen ze dood gaan.

Wat moet je doen?

Breng het dier zo snel mogelijk naar de dierenarts. Die zal vocht toedienen met een sonde tot in de maag of via een infuus. Probeer **NOOIT** bij een verzwakt dier water op te geven met een spuitje. Het dier is immers te zwak om te slikken en het vocht kan in zijn luchtpijp en zo in de longen terecht komen! Daarnaast moet de oorzaak uiteraard worden aangepakt met anti-diarree en/of anti-braak medicatie. Geef hiervoor **NOOIT** medicatie voor mensen, dit kan dodelijk zijn voor een dier!

3. De pups of kittens zijn onderkoeld

Pasgeboren honden en katten hebben van nature een vrij lage lichaamstemperatuur. Dit is op zich niet erg, maar 2 uur na de geboorte moet de temperatuur toch al flink gestegen zijn.

De pup of het kitten is hiervoor vooral afhankelijk van externe warmtebronnen: de moeder, nestgenootjes of een warmtelamp.

Onderkoeling herken je aan de volgende **symptomen**:

- onrust/piepen
- uiteindelijk op de zij gaan liggen en alleen af en toe nog naar adem happen
- sterk vertraagde ademhalingsfrequentie
- shock

Wat moet je doen?

- Het is heel belangrijk dat je TRAAG opwarmt, over een tijdsspanne van 1-3 uur.
- Eerst moet je zien of het dier niet uitgedroogd is (zie hierboven): een uitgedroogd dier opwarmen heeft geen zin want de organen krijgen op dat moment te weinig zuurstof.
- Zuurstof toedienen kan wel heel nuttig zijn: de dierenarts beschikt hiervoor over de juiste apparatuur.
- Verhoog de omgevingstemperatuur door middel van een warmtelamp. Zorg er wel voor dat de moeder ergens anders kan gaan liggen als ze het te warm krijgt! Voor moederloze pups of kittens mag de omgevingstemperatuur gedurende de eerste levensweek zelfs 29 à 32° C bedragen, gevolgd door 27° C in de daaropvolgende 3 weken!

4. De pups of kittens zijn ondervoed

Het is belangrijk de pups of kittens dagelijks te wegen. Ze moeten elke dag in gewicht bijkomen! Alleen op de eerste dag mag het gewicht maximaal 10% afnemen. Daarna moet het met 5 à 10% per dag stijgen! Het geboortegewicht dient te verdubbelen in 10 dagen tijd en te verviervoudigen na 20 dagen.

Wat kunnen de mogelijke **oorzaken** zijn van ondervoeding:

- Is de moeder in goede conditie, geeft ze voldoende melk, zijn er geen ontstoken melkklieren?
- Laat de moeder het drinken goed toe of gaat ze altijd weg van de pups of kittens?
- Is de omgevingstemperatuur ok? (zie hierboven)
- Is de omgeving rustig genoeg?

Geeft de teef of moederpoes onvoldoende melk, dan is het nodig de kleintjes met kunstmelk bij te voederen. Alle informatie daarover vind je in onze Adviesbrief 33: "pasgeboren dieren grootbrengen met de hand" (www.dapdevrijheid.be).

5. De pups of kittens vertonen **braken en/of diarree**

Wat kunnen hiervan de **oorzaken** zijn?

- te veel of juist te weinig voeding
- te geconcentreerde kunstmelk
- infecties (parasieten, virussen of een bacterie)
- een vreemd voorwerp
- een stuk darm dat in een ander stuk darm is ingeschoven door te persen.

Wat moet je doen?

Ga zeker naar de dierenarts indien de problemen langer dan één dag aanhouden. Die moet zo snel mogelijk de oorzaak zien te achterhalen. Meestal zal het diertje ook vocht toegediend moeten krijgen om uitdroging te voorkomen.



Deze adviesbrief © is een uitgave van dierenartsenpraktijk **DAP De Vrijheid** in Hoogstraten.

Andere adviesbrieven van DAP De Vrijheid kan je **gratis downloaden** op dapdevrijheid.be. Voor meer diepgaand advies bel je best voor een afspraak (tel. 03 314 87 67).



Blijf op de hoogte van de laatste praktijknieuwtjes en laat horen wat je van ons vindt op facebook.com/dapdevrijheid/