

ADVIESBRIEVEN VAN UW DIERENARTS

ADVIESBRIEF 17

ANAALKLIERPROBLEMEN BIJ HOND EN KAT

Wat zijn anaalklieren ?

Elke hond en kat heeft in de sluitspier van de anus aan twee kanten een kliertje. In de natuur wordt het anaalkliervocht gebruikt om het territorium af te bakenen. Bij onze huiskatten en honden is deze functie natuurlijk grotendeels verloren gegaan, maar de kliertjes zitten er nog wel.

Die kliertjes produceren een slecht ruikend vocht. Het wordt naar buiten gebracht via piepkleine openingen in de sluitspier van de anus. Het secreet heeft meestal een gele of grijze kleur. De klieren worden normaal gezien geledigd telkens wanneer de hond of kat stoelgang maakt. Ook in stresssituaties, waarbij de sluitspier wordt samengeknepen, kan dit het geval zijn.

Waarom kunnen deze klieren voor problemen zorgen ?

De klieren kunnen overvol of ontstoken geraken wanneer de anaalzakspiertjes niet goed werken.

Dit heeft onder andere te maken met een gewijzigde samenstelling van de voeding. In de natuur aten de voorlopers van onze honden en katten voornamelijk vlees. Daardoor was hun stoelgang harder en moesten ze dus meer persen, met een goede lediging van de anaalklieren tot gevolg. Het huidige dieet van onze huisdieren is echter veel meer gevarieerd, waardoor de ontlasting zachter wordt. De sluitspier moet minder sterk samentrekken en de kliertjes raken niet helemaal leeg geduwd.

Overvolle anaalklierzakjes kunnen leiden tot ontsteking. Daardoor wordt de inhoud van de klieren etterig, al dan niet met bloed erbij. In een verder stadium kunnen de klieren fistels vormen en openbarsten, waardoor het vocht aan de oppervlakte komt.

Welke klachten ziet u bij uw dier ?

Een gewone overvulling van de anaalklieren zal voornamelijk jeuk geven. Het dier gaat veel likken aan de anus en bijten rondom de staartbasis. Heel typisch is ook het "sleetje rijden": de hond of kat loopt rond met het achterwerk schuivend over de grond.

Wanneer de ontsteking geleid heeft tot een abces, zal er een opening zichtbaar zijn rond de anus waaruit bloed of etter komt. Het dier kan hier behoorlijk ziek van zijn (niet eten, niet uit het mandje komen, koorts maken enzovoort) en zal ook veelvuldig likken onder de staart. In dit geval dient u ons snel te contacteren: het is namelijk een zeer pijnlijk verschijnsel!

Hoe te behandelen ?

Als het om een overvulling gaat is het meestal voldoende de klieren door de dierenarts te laten leegduwen. Dit is voor het dier niet echt aangenaam en stinkt ook erg. De handeling moet bij veel patiënten om de paar maanden herhaald worden . Voor zover van toepassing, kunt u het ook aan de hondenkapper vragen om dit te doen bij elke kappersbeurt. Probeer het echter nooit zelf, tenzij we het u hebben aangeleerd!

Zien we een abces, dan is het soms nodig uw dier even onder narcose te brengen. Het abces moet dan immers gespoeld worden en soms is dit net iets te pijnlijk om het bij de wakkere hond of kat te doen. We zullen in geval van een abces ook een antibioticumkuur geven om het genezingsproces tot een goed einde te brengen.

Bij sommige patiënten helpt het leegduwen van de klieren maar voor even en duiken de klachten na enkele weken opnieuw op. We gaan dan eerst proberen door middel van een voedingssupplement de stoelgang wat harder te maken in de hoop dat het dier harder moet duwen bij het ontlasten.

Soms zullen we de anaalkieren onder narcose spoelen, om zo een optimale lediging en reiniging te krijgen.

Als ook dit geen oplossing biedt en er duiken herhaaldelijk fistels op, dan is een operatie onafwendbaar. Hierbij worden de kliertjes chirurgisch verwijderd. Dit is een delicate ingreep omdat de sluitspierzeuw niet geraakt mag worden. Dit zou immers incontinentie (het niet kunnen ophouden van de stoelgang) tot gevolg kunnen hebben.

Deze adviesbrief is een uitgave van dierenartsenpraktijk DAP De Vrijheid in Hoogstraten.

Andere adviesbrieven van DAP De Vrijheid kan je gratis downloaden op dapdevrijheid.be.



Blijf op de hoogte van het praktijknieuws en volg ons op
facebook.com/dapdevrijheid