

ADVIESBRIEVEN VAN UW DIERENARTS

ADVIESBRIEF 38

STEMBANDVERLAMMING BIJ DE HOND

Wat is het?

Stembandverlamming (of 'larynxparalyse') brengt met zich mee dat de stemspleet bij het uitademen van de hond onvoldoende open gaat staan. Daardoor krijgt hij onvoldoende lucht naar binnen. Dit komt door slecht werkende spieren ter hoogte van het strottenhoofd of door een foute bezenuwing van deze spieren.

Wat zijn de typische klachten?

- Een veranderd stemgeluid (de blaf klinkt anders); in vergevorderde gevallen blaft de hond zelfs niet meer.
- Kokhalzen of proesten tijdens het eten en drinken.
- De ademgeluiden zijn te uitgesproken (normaal hoor je een hond geen ademgeluiden maken, tenzij een kortneus ras zoals de Engelse bulldog).
- In vergevorderde gevallen: blauwverkleuring van de tong en flauwvallen.
- Het lijkt wel alsof de keel wordt dichtgeknepen bij het inademen.

Bij welke honden komt het voor?

Meestal gaat het om oude honden van grote rassen (labrador, golden retriever, bouvier enzovoort).

Waarom de spieren van het strottenhoofd slecht gaan werken weten we (meestal) niet. Soms gaat het om een spier- of zenuwziekte, maar dan zijn er meestal ook elders in het lichaam problemen.

Hoe verloopt de aandoening?

Het wordt steeds erger en erger, met ten slotte verstikking en de dood tot gevolg. Dit proces kan soms heel traag verlopen, maar soms ook sneller.

Welke aandoeningen kunnen gelijkaardige klachten geven?

- Tumoren in de buurt van het strottenhoofd.
- Hartaandoeningen.
- Het kortsnuiten-syndroom bij de bulldog-achtigen: door een combinatie van smalle neusopeningen, grote tonsillen, een lang zacht gehemelte en een nauwe luchtpijp krijgen deze dieren het ook soms lastig om normaal te ademen.
- Longziekten.
- Een te traag werkende schildklier en hierdoor een verminderde spier- en zenuwfunctie.

Hoe wordt de diagnose gesteld?

Eerst voeren we een uitgebreid lichamelijk onderzoek om te zien of er geen hart- of longprobleem bestaat (inclusief röntgen opnames van de borstholte). Een bloedonderzoek moet een schildklierprobleem uitsluiten en als dat allemaal OK is, gaan we de keel grondig inspecteren. We kijken dan of de stemspleet tijdens de inademing voldoende opent. Voor deze test gaan we de patiënt even een roesje geven.

Hoe gaan we deze aandoening behandelen?

- In milde gevallen van larynxparalyse kunnen medicamenten (kalmeringsmiddelen en zwelling verminders) al veel oplossen. Daarbij moeten we ook streven naar een optimaal lichaamsgewicht en een aangepaste levensstijl: geen stress, opwindend, rustig aan doen met warm en vochtige weersomstandigheden. De halsband vervangen we door een borsttuig!
- In ernstiger gevallen van larynxparalyse moet in acute situaties eerst gestabiliseerd worden met zuurstoftoediening, afkoeling, zwellingremmers. Soms brengen we een buisje in de keel in of maken we een tijdelijke opening in de luchtpijp.
- Na stabilisatie is chirurgie meestal noodzakelijk. Hierbij wordt meestal een hechting geplaatst in het kraakbeen van het strottenhoofd om de stemspleet in een open stand te fixeren. Vaak is operatie van alleen de meest aangetaste kant voldoende om de hond een goede kwaliteit van leven te bieden..
- Soms gaan we een stukje kraakbeen van het strottenhoofd en een stukje stemband wegnemen om zo een betere opening van de luchtpijp te verkrijgen. Bij deze methode wordt ook een tijdelijke opening gemaakt in de luchtpijp met een buisje voor een paar dagen om zo de hond goed te kunnen laten ademen.

Tot besluit

Stembandverlamming vermindert de levenskwaliteit van je hond en wordt geleidelijk aan erger, uiteindelijk in die mate dat je hond kan stikken. Als je de symptomen herkent, laat je hond dan door de dierenarts onderzoeken. Als je er snel bij bent, kan je een chirurgische ingreep wellicht nog vermijden. Ook als het geen stembandverlamming blijkt te zijn, is een bezoekje zinvol, want ook de andere aandoeningen die gelijkaardige symptomen geven vragen om behandeling.



Deze adviesbrief is een uitgave © van dierenartsenpraktijk **DAP De Vrijheid** in Hoogstraten.

Andere adviesbrieven van DAP De Vrijheid kan je **gratis downloaden** op dapdevrijheid.be. Voor meer diepgaand advies bel je best voor een afspraak (tel. 03 314 87 67).



Blijf op de hoogte van de laatste praktijknieuwtjes en laat horen wat je van ons vindt op facebook.com/dapdevrijheid/